

マルキチ印 ボルドー液用生石灰（塊状）

農林水産省 農薬登録 第3837号

有効成分及び含有量

	種 類	含 有 量
有効成分	酸化カルシウム	95.0%以上
その他成分	炭酸カルシウム	3.0%以下
	その他	2.0%以下

適用病害及使用濃度

作物名	病害名	使用濃度
馬鈴薯	エキ病、ナツエキ病	4-4式 ボルドー液
トマト	〃	(水1リットルに硫酸銅4g-生石灰4gの割)
瓜類	ベト病、タンソ病	4-2式~3-2式 ボルドー液
葡萄	ベト病、コクトウ病	3-2式~6-3式 〃
梨	黒星病、黒班病	開花前 6-6式 〃
	〃	開花後 4-8式 〃
柿	タンソ病	3-15式~2-10式 〃
密柑	ソウカ病、カイヨウ病	6-6式~4-4式 〃
リンゴ	黒点病、カッパン病	4-8式~2-10式 〃
麦	ユキグサレ病	4-4式 〃
稲	イモチ病	4-8式~3-9式 〃

◎ 以上は標準液ですから適時指導員に御相談下さい

調製上の注意事項

- ① 硫酸銅及生石灰を各々の容器に溶解した後所要濃度に希釈する。これが等温且つ低温になったならば石灰乳液の濃厚液をかきまぜ乍ら、これに硫酸銅の希釈溶液を徐々に注入して調製する。
- ② 調製液は調製後数時間以内に使用し尽す事。
- ③ 展着剤其他を混用する場合は指導員の指示に従って下さい。
- ④ 調製容器は金属製のものをを用いない事。
- ⑤ 他剤と混用して不可なるもの一石灰硫黄剤、石鹼類。

保存方法上の注意事項

- ① 生石灰は吸湿して変質するので必ず密封の上保存すること。
- ② 倉庫又は建家内で湿気が少なく地面より3センチ以上の空間を設けてパレット上に保存する事。
- ③ 保存期間中に雨洩れ等の為に包装袋に水分を附着せぬ様に注意する事。



JIS R 9001 工業用石灰
認証番号 QA0708003
生石灰(特号, 1号, 2号)
消石灰(特号, 1号, 2号)

農林水産省 農薬登録 第3837号
第5683号

〒783-0084 高知県南国市稲生760

有限会社 井上満吉商店
Tel 088-865-8446 Fax 088-865-2040
URL <http://marukichi-lime.com>